

VUOHIEN PÖTSINTÄYTEISYYSLUOKITUS



Pötsintäyteisyysluokituksessa, tai lyhyemmin pötsiluokituksessa, arvioidaan eläimen kuiva-ainesyöntiä viimeisimmän vuorokauden ajalta. Tyhjä pötsi kertoo vähäisestä syönnistä tai suuresta ruoansulatuksen läpivirtausnopeudesta, mitkä voivat viitata sairauteen tai ruokinnan epätasapainoon. Syöntiä olisi hyvä tarkastella etenkin eristäytyviltä eläimiltä, sekä yleisesti vuonimisen jälkeen alkulypsykaudella.

Pötsiluokitus tehdään eläimen vasemman kyljen puolelta, ihanteellisesti hieman takaviistosta. Karvapeite on otettava huomioon luokitusta tehdessä. Tulos riippuu siitä, miten erottuva okahaarakkeiden, lonkkakahymyn ja taaimmaisten kylkiluiden muodostama nälkäkuoppa on. Syvää, huonosta syönnistä kertovaa kuoppaa nimitetään varoituskolmioksi.



Luokka 1 = Ei syönyt riittävästi

Nälkäkuoppa on syvä ja kylki lommolla jopa ylhäältä päin katsottuna. Selvä poimu lonkkakahymystä kohti kylkiluita ja kylkiluiden jälkeen. Eläin todennäköisesti ei ole syönyt kunnolla vuorokauteen ja/tai on sairas.



Luokka 2 = Tarkkailtava

Nälkäkuoppa erottuu selvästi, ja on kättä syvempi. Selkeä poimu lonkkakahymystä kohti kylkiluita. Tyypillinen alkulypsykaudella, muuten kertoo riittämättömästä syönnistä tai nopeasta läpivirtauksesta.



Luokka 3 = Sopiva

Nälkäkuoppa erottuu karvan läpi vaivoin, korkeintaan noin kämmenen syvyinen. Syönti ja läpivirtaus on sopiva lypsävälle eläimelle, ummassa oleva voisi kaivata lisää kuitua.



Luokka 4 = Täysi

Nälkäkuoppaa ei erotu, okahaarakkeiden alla alle kämmenenlevyinen syvennys. Sopiva luokka umpieläimille ja nuorvuohille, sekä loppulypsykaudella oleville. Kyseenalainen korkeassa tuotoksessa.



Luokka 5 = Hyvin täysi

Eläimen kylki on tasainen tai pyöreä, ei syvennystä kylkirivistön jälkeen. Sopiva luokka ummassa oleville ja nuorille eläimille, lypsävillä energiansaannin riittävyttä tarkkailtava.

