

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30- 60 MIN ENNENSOLUNSAALPAAJIA!

PREDNISOLON 40 mg p.o

NIZAX = RANITIDIN 300 mg p.o

KYTRIL 2 mg p.o

Solunsalpaajat:

DOKSORUBISIINI = Adriamycin® mg + Nacl 100ml
tiputetaan 30 min

CARBOPLATIN = Paraplatin® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 15- 60 min

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

BLEOMYSIINI = Bleomycin® mg + Nacl 250ml
tiputetaan 15 - 30 min

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

5% Gluc 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla : ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg / NAVOBAN 5 mg / KYTRIL 3 mg i.v

DEXAMETASON 5 mg i.v

Solunsalpaajat: LIPOSOMAALINEN DOKSORUBISIINI = Caelyx® mg + 5%
Gluc 250 ml tiputetaan 60 min

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 4,5 mg x 1 / 5 vrk solunsalpaajien jälkeen

HEKSAVIT 300 mg x 0,5 TBL / 1 vk solunsalpaajien jälkeen

”

ELOCON 0,1 % voide x 1 / 1 vk kämmeniin ja jalkapohjiin

OMEPRATSOL 20 mg x 1 kortisonihoidon aikana

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

5% Gluc 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg iv

DEXAMETASON 5 MG IV

Solunsalpaajat:

1. **LIPOSOMAALINEN DOKSORUBISIINI** = Caelyx® mg +
5% Gluc 250 ml **tiputetaan 60 min**

Runsas huuhtelu 5 % Gluc ennen Platinolia

2. **SISPLATIINI** = Platinol® mg +Nacl 1000ml ja rinnalla
tiputetaan **MANNITOL** 500ml

Tiputusaika 3 tuntia per 1000 ml pussi

Seuraa virtsan eritystä tiputuksen aikana.

Runsas huuhtelu (Nacl) solunsalpaajien jälkeen

Potilasta ohjataan juomaan runsaasti hoidon aikana ja sen jälkeen.

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 4,5 mg x 1 / 5 vrk solunsalpaajien jälkeen

HEKSAVIT 300 mg 0,5 TBL x 1 pv / 1 vk

ELOCON 0,1 % voide x 1 / 1vk kämmeniin ja jalkapohjiin

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

5 % Gluc 500 ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg / NAVOBAN 5 mg/ KYTRIL 3 mg iv

DEXAMETASON 5 mg iv

Solunsalpaajat:

**1. LIPOSOMAALINEN DOKSORUBISIINI = Caelyx® mg +
5% Gluc 250ml tiputetaan 60 min**

Runsas huuhtelu 5% Gluc ennen Paraplatinia

Nacl 500ml tippumaan

**2. CARBOPLATIN = PARAPLATIN® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 30- 60 min**

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 4,5 mg x 1 / 5vrk solunsalpaajien jälkeen

PYRIDOKSIINI (vit -B6) 200 mg x 1 kerran päivässä / viikko

ELOCON 0,1 % voide x 1 / 1vk kämmeniin ja jalkapohjiin / viikko

OMEPRATSOLI 20 mg x 1 iltaisin kortisonihoidon aikana

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

		Pvm.	
		pituus	cm
		paino	kg
		pinta-ala	m ²
vrk 1,3,5	1. NaCl 1000 ml tippumaan, laita kolmitiehana (apt, huuhtelu)		
vrk 1,3,5	2. PL-K (perusliuos K) 2000 ml tippumaan, nesteytys 16 h aikana. keskeytetään muiden lääkkeiden antojaksi.		

Esilääkitys osastolla: esilääkkeet annetaan ennen PL-K liuoksen aloittamista

vrk 1-5	Navoban 5 mg + NaCl 100 ml, tiputusaika 15 min		
vrk 1-5	Temesta 1 mg po		
vrk 1,3,5	Prednisolon 20 mg po		
vrk 1,3,5	Furesis 40 mg po		
vrk 1,3,5	3. ETOPOSIDI = Etopofos ®	mg + NaCl 100 ml tiput. 15 min	
vrk 1,3,5	4. MESNA* = Uromitexan®	mg+ NaCl 100 ml tiput.	
vrk 1,3,5	5. IFOSFAMIDI = Holoxan®	mg + NaCl 1000 ml tiputetaan 1h	
vrk 1,3,5	6. MESNA* = Uromitexan®	mg+ NaCl 100 ml tiput. tiputetaan 4h kuluttua IFOSFAMIDIN aloituksesta	
vrk 1,3,5	7. MESNA* = Uromitexan®	mg+ NaCl 100 ml tiput. tiputetaan 8h kuluttua IFOSFAMIDIN aloituksesta	

Seurattavat lab.arvot:

Syklin alussa: solunsalpaajaverikokeet + markerit

Päivittäin: K,Na,krea, paino, virtsan veri

Huomattavaa:

Vrk nestemäärä 4000–5000 ml

Seuraa virtsaneritystä, VM (ptl virtsaa kannuun ja merkitsee VM:n ylös)

Jos verivirtsaisuutta, lisätään **MESNA**-annosta ja nesteytystä

Jos paino nousee > 1 kg, tarv. **Furesis** 5-10 mg i.v

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v

Solunsalpaajat:

ETOPOSIDI = Etopofos® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 30 - 60 min

BLEOMYSIINI = Bleomycin® mg + Nacl 250ml
tiputetaan 15 - 30 min

SISPLATIN = Platinol® mg + Nacl 500ml
ja rinnalla tiputetaan **MANNITOL** 500ml
tiputetaan 2-3 tuntia

Seuraa virtsan eritystä tiputuksen aikana.

Runsas huuhtelu (Nacl) solunsalpaajien jälkeen

Potilasta ohjataan juomaan runsaasti hoidon aikana ja jälkeen.

Lääkitys kotona: Pahoinvoinnin hoitoon tarvittaessa **DEXAMETASON** 7.5 mg x 2 3-4 vrk

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla:

ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

Zofran 8 mg i.v / Navoban 5mg i.v

Solunsalpaajat:

ETOPOSIDI = Etopofos® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 30 - 60 min

SISPLATIN = Platinol® mg + Nacl 500 ml
ja rinnalla tiputetaan **MANNITOL** 500ml
tiputetaan 2-3 tuntia

Seuraa virtsan eritystä tiputuksen aikana.

Runsas huuhtelu (Nacl) solunsalpaajien jälkeen

Potilasta ohjataan juomaan runsaasti hoidon aikana ja jälkeen

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30- 60 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

PREDNISOLON 40 mg p.o

RANITIDIN 300 mg p.o

KYTRIL 2 mg p.o

JÄÄMYSSY PÄÄHÄN 15 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

Solunsalpaajat:

EPIRUBISIINI = FARMORUBISIN® mg + Nacl 250 ml
tiputetaan 10- 30 min
suojataan valolta (kääritään folioon)

CARBOPLATIN = PARAPLATIN® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 15- 60 min

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

1. HOITOPÄIVÄ

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

1. **GEMSISTABIINI** = Gemzar® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 30-60min

2. **CARBOPLATIN** = Paraplatin® mg +Nacl 500 ml
tiputetaan 30-60min

2. HOITOPÄIVÄ 8. PV:NÄ EDELLISISTÄ LÄÄKKEISTÄ ELI SAMANA VIIKON PÄIVÄNÄ

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg iv / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat: **GEMSISTABIINI** = Gemzar® mg + NaCl 500 ml
tiputetaan 30-60 min

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

1.HOITOPÄIVÄ Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

1. GEMSISTABIINI = Gemzar® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 30-60min

2. SISPLATIN = Platinol® mg +Nacl 1000ml (Tarv. voi
laimentaa 40-100 mg annokset 500 ml:aan)
Rinnalla tiputetaan **MANNITOL 500 ml**

Tiputusaika 3 tuntia per 1000 ml pussi!!!!

Seuraa virtsan eritystä tiputuksen aikana.

Runsas huuhtelu (Nacl) solunsalpaajien jälkeen.

**Potilasta ohjataan juomaan runsaasti hoidon aikana ja
jälkeen.**

Lääkitys kotona:

Pahoinvoinnin hoitoon **tarvittaessa DEXAMETASON 7.5 mg x 2 3-4 vrk**

2. HOITOPÄIVÄ **8. PV:nä EDELLISISTÄ LÄÄKKEISTÄ ELI SAMANA VIIKONPÄIVÄNÄ**

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

GEMSISTABIINI = Gemzar® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 30-60min

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

1. hoitopäivä Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

* Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

Zofran 8 mg i.v / Navoban 4 mg i.v / Kytril 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

1. GEMSISTABIINI = Gemzar® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 30-60 min

2. HOITOPÄIVÄ 8.PV:NÄ EDELLISISTÄ LÄÄKKEISTÄ ELI SAMANA VIIKONPÄIVÄNÄ

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

* Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

NIZAX = RANITIDIN 300 mg p.o

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

GEMSISTABIINI = Gemzar® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 30-60min

DOKETAKSELI = Taxotere® mg + Nacl 250ml
tiputetaan 60min

* Infuusiota edeltävänä iltana ottaa kotona **DEXAMETASON 7.5 mg p.o**
Solunsalpaajahoitopäivän aamuna kotona **DEXAMETASON 7.5 mg p.o**
Jatkot infuusion jälkeen: **DEXAMETASON 7.5 mg x 2**
Jatkaa vielä 4 kertaa (yhteensä **DEXAMETASON 3vrk** lääkitys hoidon yhteydessä)

*Jos potilas on unohtanut ottaa kortisonit ennen hoitoa, annetaan juuri ennen infuusiota
DEXAMETASON 25 mg i.v

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

SOLUNSALPAAJAT:

**CARBOPLATIN = PARAPLATIN®
tiputetaan 60 min**

mg + Nacl 500 ml

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

SISPLATIINI = Platinol® mg + Nacl 1000 ml (Tarvittaessa
voi laimentaa 40-100 mg annokset 500 ml:aan)

Rinnalla tiputetaan **MANNITOL 500 ml**

Tiputusaika 3 tuntia per 1000 ml pussi!!!!

Seuraa virtsan eritystä tiputuksen aikana.

Runsas huuhtelu (Nacl) solunsalpaajien jälkeen.

Potilasta ohjataan juomaan runsaasti hoidon aikana ja sen jälkeen!

Lääkitys kotona: Pahoinvoinnin hoitoon **tarv. DEXAMETASON 7.5 mg x 2 3-4 vrk**

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ONDANSETRON 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v/ KYTRIL 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

1. **TOPOTEKAANI** = Hycamtin® mg+ 100 ml 5 %:sta
glukoosiliuosta
tiputetaan 30 min

2. **SISPLATIINI** = Platinol®, Cisplatin® mg + Nacl 1000 ml
rinnalla tiputetaan **MANNITOL 500 ml**
tiputusaika 3 h per 1000 ml pussi

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla:

PRENISON 120 mg p.o EDELTÄVÄNÄ ILTANA JA HOITOPÄIVÄN AAMUNA.

SETIRITSIINI 10 mg p.o TUNTI ENNEN INFUUSIOTA

DEXAMETASON 10-20 mg i.v 45 MIN ENNEN INFUUSIOTA

RANITIDIINI 50 mg i.v PUOLI TUNTIA ENNEN INFUUSIOTA

KYTRIL 2mg p.o

Solunsalpaajat:

**PAKLITAKSELI = Taxol® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 3 tuntia**

rinnalla Nacl 500 ml aukipitona

PVC- VAPAAT LETKU, SUODATIN JA PUSSI (VIAFLO)!!!

Lääkitys kotona: **DEXAMETASON 3 mg x 3 p.o 3 vrk**

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!!!!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

1.HOITOPÄIVÄ

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys:

PREDNISON 120 mg p.o EDELTÄVÄNÄ ILTANA JA HOITOPÄIVÄN AAMUNA

CETIRITZIN 10 mg p.o 1 TUNTI ENNEN INFUUSIOTA

DEXAMETASON 10–20 mg i.v 45 MIN ENNEN INFUUSIOTA

RANITIDIINI 50 mg i.v PUOLI TUNTIA ENNEN INFUUSIOTA

KYTRIL 2 mg p.o

Solunsalpaajat:

PAKLITAKSELI = Taxol® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 24 tuntia
rinnalla Nacl 1000ml aukipitona

2. HOITOPÄIVÄ

Esilääke osastolla : ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL3 mg i.v

Solunsalpaajat:

CARBOPLATIN = Paraplatin ® mg + Nacl 500ml
tiputetaan 30–60 min

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!!!!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Esilääkitys kotona:

PREDNISOLON 120 mg p.o edeltävänä iltana ja hoitopäivän aamuna

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla:

CETIRITZIN 10 mg p.o TUNTI ENNEN INFUUSIOTA

DEXAMETASON 10-20 mg i.v 45 MIN ENNEN INFUUSIOTA

Kytril 2 mg p.o

Ranitidiini 50 mg puoli tuntia ennen infuusiota

Solunsalpaajat:

**PAKLITAKSELI = Taxol® mg + Nacl 1000 ml
tiputetaan 3 tuntia**

**CARBOPLATIN = Paraplatin® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 30- 60 min**

PVC- VAPAAT LETKU, SUODATIN JA PUSSI (VIAFLO)!!!

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 3 mg x 3 p.o 3 vrk

OMEPRATSOLI 20mg x 1 p.o 3 vrk

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!!!!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Esilääkitys kotona:

PREDNISON 120 mg p.o EDELTÄVÄNÄ ILTANA JA HOITOPÄIVÄN AAMUNA

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla:

CETIRITZIN 10 mg p.o 1 TUNTI ENNEN INFUUSIOTA.

DEXAMETASON 10-20 mg i.v 45 MIN ENNEN INFUUSIOTA.

RANITIDIN 50 mg i.v PUOLI TUNTIA ENNEN INFUUSIOTA.

ZOFRAN 8 mg i.v / Navoban 5 mg i.v / Kytril 3 mg i.v

Solunsalpaajat:

1. PAKLITAKSELI = Taxol® mg + Nacl 1000ml
tiputetaan 3 tuntia
rinnalla Nacl 500 ml aukipitona

PVC- VAPAAT LETKU, SUODATIN JA PUSSI (VIAFLO)!!!

2.SISPLATIN = Platinol® mg +Nacl 1000ml
rinnalla tiputetaan **MANNITOL 500ml**

Tiputusaika 3 tuntia per 1000 ml pussi!!!!

Seuraa virtsan eritystä tiputuksen aikana.

Runsas huuhtelu (Nacl) solunsalpaajien jälkeen

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 3 mg x 3 p.o 3 vrk
OMEPRATSOLI 20 mg x 1 p.o 3 vrk

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET!!!!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Esilääkitys kotona:

**Infuusiota edeltävänä iltana ja hoitopäivän aamuna
DEXAMETASON 7.5 mg p.o**

Nacl 1000ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v

Nizax 300 mg p.o

Jos potilas on unohtanut ottaa kortisonit kotona,annetaan juuri ennen infuusiota DEXAMETASON 25 mg i.v

Solunsalpaajat:

**DOKETAKSELI = Taxotere® mg + Nacl 250 ml
tiputetaan 30-60 min.**

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 1,5 mg 3tbl x 2 3 vrk:n ajan

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET !!

Pvm.
pituus cm
paino kg
pinta-ala m²

Esilääkitys kotona:

EDELLISENÄ ILTANA JA HOITOPÄIVÄN AAMUNA
DEXAMETASON 7.5 mg

Nacl 500ml tippumaan, laita kolmitiehana

Esilääkitys osastolla: ANNETAAN 30 MIN ENNEN SOLUNSAALPAAJIA!

ZOFRAN 8 mg i.v / NAVOBAN 5 mg i.v / KYTRIL 2 mg p.o

RANIXAL 300 mg p.o

CETIRIZIN 10 mg p.o

JOS POTILAS ON UNOHTANUT OTTAA KORTISONIT
ENNEN HOITOA ANNETAAN JUURI ENNEN INFUUSIOTA
DEXAMETASON 25 mg i.v

Solunsalpaajat:

DOKETAKSELI = Taxotere® mg + Nacl 250 ml
tiputetaan 30–60 min

CARBOPLATIN = Paraplatin ® mg + Nacl 500 ml
tiputetaan 30–60 min

Lääkitys kotona:

DEXAMETASON 1.5 mg 3 tbl x 2 kolmen vrk:n ajan

MUISTA ENSIAPULÄÄKKEET !!!!!