

Ventrogluteaalisen injektion antaminen

Minna Suoperä, Matti Suopajarvi ja Kyllikki Tervonen

Etuja


- Turvallinen, ei suuria verisuonia eikä hermoja
- Imeytyminen varmempaa, ohut rasvakerros
- Injisoitava määrä suurempi kuin olkavarteen
- Soveltuu kaikille yli 7 kk ikäisille

Injektion valmistelu

- Aseptinen toiminta kaikissa vaiheissa
- Kädet pestään jos likaiset
- Käsien desinfiointi
- Rauhallinen paikka
- Turvallisuus

Injektion valmistelu

- Kerää tarvittavat välineet
- Informoi potilasta



Injektion valmistelu

- Avaa lääkeampulli käyttäen suojana sidetaitosta



Injektion valmistelu

- Pistä terävät esineet särmäisjäteastiaan sitä mukaa kun niitä tulee



Injektion valmistelu

- Vedä lääkeaine ruiskuun suodatinneulalla



Injektion valmiste

- Poista ilmakuplat



Injektion valmistelu


- Vaihda injektioneula (vähintään 38 mm pitkä)
- Obeesimmeille 50 mm asti (ja yli*)




Injektiokohdan paikallistaminen



Injektiokohdan paikallistaminen



Injektiokohdan paikallistaminen



Injektion antaminen

- Paina injektiokohtaa 10 sekuntia
- Desinfioi paikka puhdistuslapulla pyyhkäisemällä



Z-tekniikka

- Z-tekniikassa pintakudosta siirretään sormilla injektion ajaksi 2-3 cm sivuun.
- Injektion jälkeen ote irroitetaan
- Tekniikalla ehkäistään lääkkeen valuminen ulos lihaksesta



Injektion antaminen

- Venytä ihoa (Z-tekniikka)
- Pistä neula lihakseen (1/3 neulasta jää ulkopuolelle)
- Tarkista aspiroimalla ettei neula ole verisuonessa
- Injisoi lääke lihakseen nopeudella 1 ml / 10 sekuntia



Injektion pistäminen

- Poista neula
- Irroita ihoa pingoittava käsi neulan poiston jälkeen
- Paina injektiokohtaa haavataitoksella tovi.



Injektion piston jälkeen

- Tarkkaile potilasta mahdollisten sivuvaikutuksien vuoksi n. 30 min.
- Seuraa injektioaluetta pitemmälläkin aikajaksolla
- Vaihda injektiopuolta eri kertojen välillä

Kiitos

Minna, Matti ja Kyllikki